


M.A.D.R – AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA
OFICIUL FITOSANITAR ILFOV
LOC. STEFANESTII DE JOS, STR. ZORILOR, Nr. 21, JUD. ILFOV
Tel./Fax.0213379739
E- mail Fitosanitar.ilfov@gmail.com



BULETIN DE AVERTIZARE
Nr.52 din 06. 06. 2017

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția daunătorului/bolii:
EURYGASTER SP. (PLOSNIȚA CEREALELOR) –larve de varsta a III-a
care poate cauza pierderi importante la cultura: **GRAU**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: **EURYGASTER SPP.(plosnița cerealelor)**, prezintă o generație pe an. Culturile de grâu în timpul vegetației sunt atacate atât de către adulții hibernanți cât și de indivizii din noua generație (larve și adulți noi), hrănirea făcându-se pe toate organele aeriene ale plantei (tulpina, frunze, spic). După apariția adulților hibernanți în cultură, sunt vătămate frunzele și tulpinile. Frunza centrală și, într-un stadiu mai avansat, tulpina se îngălbenesc și se usucă începând de la locul întepăturii. Atacul produs deasupra ultimului nod, în timpul formării spicului în burduf, atrage după sine îngălbenirea, vestejirea și chiar distrugerea spicului. Dacă atacul s-a produs după ce spicul a ieșit din burduf și până la legat, acesta se albește. Începând din varsta a III-a, larvele desfășoară o intensă activitate de hrănire pe boabele de grâu. Această activitate fiind continuată de noi adulți. Hrănirea și atacul daunătorilor din noua generație (larve și adulți) au loc pe boabele în formare și pe cele deja formate până la recoltarea lor. Boabele aflate în ultima fază de dezvoltare, care au fost atacate este marcat de un punct negru înconjurat de o zonă decolorată. Partile din bob întepate devin cretoase și albe.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului nr. 1, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: Depășirea pragului economic de daunare (peste 3 plosnițe /mp)

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz

1. **BISCAYA 240 OD** - 0,2 l/ha sau
2. **FASTAC 10 EC** - 0,1 l/ha sau
3. **LAMDEX 5 EC (FASTER GOLD-a doua denumire comercială)** - 0,15 l/ha sau
4. **CALYPSO 480 SC** - 0,1 l/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament: 11 – 18. 06. 2017

ATENȚIE!!!!

Vor fi anunțati apicultorii astfel încât aceștia să poată proteja familiile de albine, prin închiderea sau îndepărtarea stupilor în interval de timp cât mai redus cu putință. Se va instiinta în scris cu cel puțin 5 zile înainte de începerea tratamentului, consiliile locale comunale comunicând:

- Data începerii și durata tratamentului;
- Locul unde se aplică tratamentul;
- Denumirea produsului folosit și remanenta acestuia;
- Mijlocul cu care se execută : avio,terestru.

Consiliile locale comunale va lua măsuri pentru anunțarea în scris, sub semnatura de luare la cunostință, a tuturor detinatorilor de stupine situate în raza teritorială a localității, precum și circumscriptia sanitar- veterinară, despre locul, data începerii tratamentului și mijloacele cu care se execută acesta.

Alte recomandări:

Tratamentul se va efectua la temperaturi mai mici de 25°C, în perioada avertizată și pe timp liniștit.

Unitatile agricole care executa sau beneficiaza de tratamente fitosanitare cu pesticide, personalul care participa la aceste tratamente si detinatorii de familii de albine sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea intoxicatiilor la familiile de albine potrivit prezentului ordin. Tratamentele cu pesticide asupra culturii de grau, se vor desfasura in perioade de timp cat mai scurte care nu vor depasi 7 zile consecutive pentru cultura de grau.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Citiți cu atenție prospectul produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicățiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agencia Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicățiilor cu produse de protecția plantelor.

Suprafetele tratate se vor inscripiona cu tablite de avertizare "TEREN OTRAVIT"

IMPORTANT !

BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

Intocmit, Maria BOGDAN