



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ILFOV



INTERNATIONAL YEAR OF  
PLANT HEALTH

ROMANIA JUDEȚUL ILFOV

COMUNA MOGOȘOAIA  
REGISTRATURĂ

Nr.

16255

Ziua

03

Luna

06

Anul

2020

Comuna Stefanestii de Jos,  
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739

e- mail: [fitosanitar.ilfov@gmail.com](mailto:fitosanitar.ilfov@gmail.com)

### BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.49 din 03. 06. 2020

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și evoluția daunătorului/bolii:

**EURYGASTER SP. (PLOSNIȚA CEREALELOR) – larve de varsta a III-a**

care poate cauza pierderi importante la cultura: **GRAU**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: **EURYGASTER SPP.(plosnița cerealelor)**, prezintă o generație pe an. Culturile de grau în timpul vegetației sunt atacate atât de către adulții hibernanți cât și de indivizii din noua generație (larve și adulți noi), hrănirea făcându-se pe toate organele aeriene ale plantei (tulpina, frunze, spic). După apariția adulților hibernanți în cultură, sunt vătămate frunzele și tulpinile. Frunza centrală și, într-un stadiu mai avansat, tulpina se îngălbenesc și se usuca începând de la locul întepăturii. Atacul produs deasupra ultimului nod, în timpul formării spicului în burduf, atrage după sine îngălbenirea, vestejirea și chiar distrugerea spicului. Dacă atacul s-a produs după ce spicul a ieșit din burduf și până la legat, acesta se albesc. Începând din varsta a III-a, larvele desfășoară o intensă activitate de hrănire pe boabele de grau. Această activitate fiind continuată de noi adulți. Hrănirea și atacul daunătorilor din noua generație (larve și adulți) au loc pe boabe în formare și pe cele deja formate până la recoltarea lor. Boabe aflate în ultima fază de dezvoltare, care au fost atacate este marcat de un punct negru inconjurat de o zonă decolorată. Partile din bob întepate devin cretoase și albe.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului nr.1, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: Depășirea pragului economic de daunare (peste 3 plosnițe /mp)  
Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz

1. **FURY 10 EC - 0.1 l/ha sau**
2. **FASTAC 10 EC - 0,1 l/ha sau**
3. **MOSPILAN 20 SG - 0,1 kg./ha. sau**

**ALTE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR OMOLOGATE**

Perioada optimă de tratament: **09 – 17. 06. 2020**

**ATENȚIE!!!!**

Vor fi anunțati apicultorii astfel încât aceștia să poată proteja familiile de albine, prin închiderea sau îndepărtarea stupilor în interval de timp cât mai redus cu putință.  
Se va înștiința în scris cu cel puțin 5 zile înainte de începerea tratamentului, consiliile locale comunale comunicând:

- Data începerii și durata tratamentului;
- Locul unde se aplică tratamentul;
- Denumirea produsului folosit și remanenta acestuia;
- Mijlocul cu care se execută : avio,terestru.
- Consiliile locale comunale va lua măsuri pentru anunțarea în scris, sub semnatura de luare la cunostință, a tuturor detinatorilor de stupine situate în raza teritorială a localității, precum și

**Executa acesta.**

**Alte recomandari:**

Tratamentul se va efectua la temperaturi mai mici de 25°C, in perioada avertizata si pe timp linistit.

Unitatile agricole care executa sau beneficiaza de tratamente fitosanitare cu pesticide, personalul care participa la aceste tratamente si detinatorii de familii de albine sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea intoxicatiilor la familiile de albine potrivit prezentului ordin.

Tratamentele cu pesticide asupra culturii de grau, se vor desfasura in perioade de timp cat mai scurte care nu vor depasi 7 zile consecutive pentru cultura de grau.

Tratamentul se aplica in zile fara vant si se va repeta in functie de remanenta produsului folosit si de conditiile meteo;

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor recomandate in PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Daca in perioada recomandata intervin conditii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numarul de zile in care nu s-a putut lucra.

Citiți cu atentie prospectul produselor de protectia plantelor înainte de utilizare !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Utilizatorii (fermierii, producatorii agricolo) aveti obligatia de a respecta cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii si nr.127/1991 al ACA din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre Agentia Nationala Fitosanitara si Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Respectarea normelor de clima si mediu privind Ecoconditionalitatea (SMR 10), neaplicarea tratamentelor fitosanitare in apropierea apelor de suprafata in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.

Suprafetele tratate se vo inscripiona cu tablite de avertizare "Sola tratata cu produse de protectie a plantelor"(denumire produsului folosit.)

**IMPORTANT !**

**BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

Intocmit consilier, Maria BOGDAN