



	ROMÂNIA • JUDEȚUL ILFOV
	COMUNA MOGOȘOAIA REGISTRATURĂ
Nr. 7105	Ziua 15 Luna 03 Anul 2022


Autoritatea Nationala Fitosanitara Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 09 din 15.03.2022

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **COMPLEX DAUNATORI (PHYTODECTA F.; SUBCOCCINELLA-24 PUNCTATA.)**



PHYTODECTA F.(gandacul rosu al lucernei) Aparitia are loc timpuriu in primavara, cand temperaturile medii zilnice sunt cuprinse intre 8-9 C. Adultii si larvele ataca frunzele si lastarii plantei. In primavara adultii rod frunzele marginal sau le perforaza. Larvele rod frunzele de la margini spre nervura principala, pe masura ce ele se dezvoltă, disruga aproape total frunzele lasand decat nervurile principale. In caz de aparitii in masa sunt atacati si lastarii, astfel in cat plantele se usuca.



SUBCOCCINELLA-24 PUNCTATA (buburuza lucernei), insecta prezinta doua generatii pe an. Prima generatie se dezvoltă în lunile mai- iunie, iar a doua în lunile iulie - august. Insecta ataca în stadiul de adult și larva distrugând epiderma și tesutul frunzei, de unde extrag suc. Frunzele rămân sub forma unor creste paralele și albicioase. În urma atacului, frunzele se răsuceșc și se usucă.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la cultura: **LUCERNA VECHĂ FURAJERĂ ȘI DE SAMANTA.**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: S-a depășit >30 % plante cu atac.

cu:

1. **KARATE ZEON** - 0,150 l/ha. sau

2. **FASTAC 10 EC** - 0 150 l/ha. sau

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Măsuri alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice;

Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimi ce trebuie preferate metodele chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

Perioada optimă de tratament: **IMEDIAT DUPĂ PORNIREA ÎN VEGETAȚIE**

DE RETINUT! Pentru produsul de protecție a plantelor **FASTAC 10 EC**, se acordă o perioadă de grație conform prevederilor Regulamentului nr. 1107 /2009, pentru eliminare, depozitare și utilizarea stocurilor existente la utilizator (până la data de 01.05.2022).

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoza și Avertizare

Maria BOGDAN

