



	ROMANIA · JUDEȚUL ILFOV
	COMUNA MOGOȘOALA REGISTRATURĂ
Nr. 7107	Ziua 15 Luna 03 Anul 2022

Autoritatea Nationala Fitosanitara Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 11 din 15.03.2022


Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **SPHAEROTHECA F. (AINAREA)** ;
DIPLOCARPON R. (PATAREA AGRA) ; **PHRAGMIDIUM D. (RUGINA)**.



SPHAEROTHECA F.(Fainarea). Se manifesta pe frunze, ramurile tinere, pe boboci si chiar pe fructe in toata perioada de vegetatie a plantei. Pe ambele fete ale frunzelor atacate apar diferite pete de culoare alba, formate din miceliul, conidioforii si conidiile ciupercii. Tesuturile din dreptul petelor sufera un proces de necroza, iar frunzele se rasucesc si se usuca. Ramurile tinere atacate sunt acoperite de o pasla miceliana, compacta, albicioasa la inceput, apoi galbuie. Ramurile atacate nu se lignifica complet. Bobocii floralii sunt acoperiti de miceliul albicios, raman mai mici si nu mai formeaza flori.



DIPLOCARPON R. (Patarea neagra). Pe frunzele atacate, apar pete circulare, de 3- 10 mm in diametru, de culoare negricioasa- violacee. Petele sunt vizibile pe fata superioara a limbului. Datorita atacului, frunzele bolnave cad de timpuriu, iar plantele formeaza putine flori.



PHRAGMIDIUM D. (Rugina). Se manifesta pe frunze, flori, lastari si fructe. Pe fata superioara apar primavara pete galbene, in dreptul carora, pe fata inferioara se formeaza pustule portocalii.

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la cultura : **TRANDAFIR**

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii: **PREVENTIV IN PARCELELE UNDE IN ANUL ANTERIOR S-A DETERMINAT ATAC PESTE P.E.D**

cu:

1. **MIRAGE 45 EC** - 0,1 % sau
2. **MOLINA** - 0,6% sau
3. **TOPAS 100 EC** - 0,5 % sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Masuri alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice;

Masuri durabile: biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodele chimice, daca acestea asigura un control corespunzator al organismelor daunatoare.

Perioada optima de tratament; **LA APARITIE, SI SE VA TERMINA IN 4- 5 ZILE.**

Alte recomandari:

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognza si Avertizare

Maria BOGDAN

