



	ROMANIA · JUDEȚUL ILFOV
	COMUNA MOGOȘOAI REGISTRATURĂ
Nr. 7872	Ziua 23 Luna 03 Anul 2022

Autoritatea Nationala Fitosanitara Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com


BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.14 din 23.03.2022


Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **OMIZI DEFOLIATOARE (PONTE HIBERNANTE)**

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la: **CIRES - VISIN**
cu:

- 1. FASTAC 10 EC - 0,02 % (0,2 l/ ha.) sau**
 - 2. KARATE ZEON (NINJIA la doua denumire comerciala) 0,015 % (0, 15 l/ha.) sau**
alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.
- Masuri alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice;
Masuri durabile: biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodele chimice, daca acestea asigura un control corespunzator al organismelor daunatoare.
Tratamentul se va complexa cu fungicide pentru combaterea bolilor:
MONILINIA SPP. (Monilioza); COCOMYCES H. (Antragnoza frunzelor de cires)



Scurtă descriere a organismului daunator: **Monilinia spp. (Monilioza)**, boala se manifesta pe flori, ramurile tinere si fructe. Cel mai periculos atac este acela produs pe flori. Buchetele de flori sunt infectate inainte de deschiderea petalelor si, cel mai tarziu, cand florile sunt deschise. Buchetul floral se usuca repede. Frunzele se vestejesc, luand aspectul unui buchet uscat. Infectia poate ajunge si pe ramuri, pe care uneori apar gome. Cand atacul este tarziu, petele se detaseaza de pericarpul fructului in curs de formare.



COCOMYCES H. (Antragnoza frunzelor de cires), sunt atacate în special frunzele și într-o mică măsură ramurile. Pe frunze, atacul se manifestă prin apariția pe fața superioară a limbului numeroase pete punctiforme, de culoare purpurie, care cu timpul se măresc. Pe fața inferioară a limbului, petele sunt mai delimitate, iar colorația este mai palidă. Frunzele infectate încep să se usuce, devin fragile, se răsucesc și cad prematur. Pomii rămânând cu ramurile defoliate.

Pe ramuri înainte de înfrunzirea pomilor apar numeroase fructificații ale ciupercii, care erup prin leziunile produse pe scoarta. Porțiunile de ramuri se usucă repede, iar frunzele cad.

- 1. LUNA EXPERIENCE 400 SC - 0,05 % (0,5 l./ ha.) sau**
- 2. SCORE 250 EC - 0,02 % (0,2 L/ha.) sau**

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României. Perioada optimă de tratament: FAZA FENOLOGICĂ "BUTON ALB"

DE RETINUT! Pentru produsul de protecție a plantelor FASTAC 10 EC, se acordă o perioadă de grație conform prevederilor Regulamentului nr. 1107 /2009, pentru eliminare, depozitare și utilizarea stocurilor existente la utilizator (pană la data de 01.05.2022).

Alte recomandări:

Perioada de tratament se prelungeste cu numărul de zile nefavorabile din cauza precipitațiilor!

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire, de pe eticheta produsului!

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoza și Avertizare
Maria BOGDAN

