

Autoritatea Nationala Fitosanitara
Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 35 din 09.05.2023

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare : **RHAGOLETIS CERASI (Musca ciresilor)**

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la: **CIRES**

Scurtă descriere a dăunătorului: **RHAGOLETIS CERASI (Musca ciresilor)**, *aparitia primilor adulti are loc in a doua jumătate a lunii mai, cand fructele sunt inca mici si verzi. Zborul mustelor se esaloneaza pe o perioada de 40 – 67 zile, intre 15 mai si 30 iulie. La aparitie, mustele zboara in coroana pomilor si se hranesc cu sucurile dulci de pe fructe. Depunerea oualor incepe in prima sau a doua decada a lunii iunie. Femela depune cate un ou sub epiderma fructului sau in pulpa. Ecloziunea primelor larve se inregistreaza din a doua jumătate a lunii iunie, aparitia lor in masa avand loc la sfarsitul lunii. Larvele consuma pulpa fructului din jurul samburelui. La completa dezvoltare larva paraseste fructul, unde patrunde in sol si se transforma in pupa, stadiu care intra in diapauza estivala si apoi in hibernare.*

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **nr.1**, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii:

cu:

1. **KARATE ZEON (NINJA - a doua denumire comerciala)- 0,015% sau**

2. **LASER 240 SC -0,06% sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul se va complexa cu fungicide pentru combaterea bolilor: **MONILINIA SPP. (Monilioza); COCOMYCES H. (Antracnoza frunzelor)**



MONILINIA SPP. (Monilioza), boala se manifesta pe

fructe si ramurile tinere. Frunzele se vestejesc, luand aspectul unui buchet uscat. Cand atacul este tarziu, petele se detaseaza de pericarpul fructului in curs de formare, iar pedunculul se acopera cu o masa abundenta de conidii. Pedunculii se indoiesc in asa fel incat florile par lipite una de alta. Acest aspect face ca simptomul sa fie vizibil in pomul inflorit. Pe ramuri se observa o uscarea, incepand de la varf si pana la

insertia cu pedunculii uscati. Fructele infectate se inmoaie, se incretesc, iar pulpa putrezeste si devine granuloasa.



COCOMYCES H. (Antracnoza frunzelor), boala se

manifesta pe frunze si intr-o mica masura pe ramuri si fructe. Pe frunze, atacul se manifesta prin aparitia pe fata superioara a limbului a numeroase pete punctiforme, de culoare purpurie, care cu timpul se maresc, formand portiuni mari pe frunze, ce capata o culoare bruna-purpurie. Frunzele infectate incep sa se usuce, devin fragile, se rasucesc si cad prematur, pomii raman cu ramurile defoliate. Pe ramuri, atacul se manifesta inainte de infrunzirea pomului apar numeroase fructificatii ale ciupercii, care erup prin leziunile produse pe scoarta. Sunt atacate in special ramurile terminale. Portiunile de ramuri se usuca.

1. LUNA EXPERIENCE 400SC - 0,5 % sau
2. MERPAN 80 WDG /CAPTADIN 80 WDG – 0,2 % - sau
3. SCORE 250 EC / MAVITA 250EC - 0,02 % sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: INTRAREA IN PARGA A SOIURILOR TIMPURII.

Alte recomandari:

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor !

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, cele de securitate a muncii, de protectie a animalelor si familiilor de albine in conformitate cu : Legea Apiculturii nr. 383/2013 , cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 127/1991 al ACA din Romania , Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor.

Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii urale, nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor .

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Mediului , Apelor si Padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/542015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare
Maria BOGDAN