NR: 8259
DATA: 08/04/2026
COD: A696
COMUNA HOGOSOAIA

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV-CALARASI-GIURGIU
OFICIUL FITOSANITAR ILFOV,Str.Zorilor nr.21,Stefanestii de Jos,judetul Ilfov,
Tel:021.3379.739, e-mail:ofilfov@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 20 din 07. 04.2026

Oficiul Fitosanitar Ilfov, recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la cultura de : **RAPIȚĂ**
Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunătoare: **MELIGETHES AENEUS** (gandacul lucios);**PLUTELLA XYLOSTELLA** (molia verzei); **CEUTORHYNCHUS NAPI** (gărgărița tulpinilor de rapiță); **CEUTORHYNCHUS ASSIMILIS** (gărgărița silicvelor); **APHIS SPP**.(afide).
MELIGETHES AENEUS (gandacul lucios),*adultul are corpul oval, de 1,5 – 2,7 mm lungime de culoare verde-aramie sau albastruie, cu luciu metalic sau mat. Adultii se hranesc cu organele florale din bobocii inca nedesfacuti.Larva este oligopoda, la completa dezvoltare de 3,5 mm lungime, corpul este de culoare alba. Insecta prezinta o generatie pe an,ierneaza ca insecta adulta in stratul superficial al solului.Spre sfarsitul lunii aprilie, la formarea tulpinilor si lastarilor floriferi insectele isi fac aparitia, trecand pe inflorescentele acestora continundu-si hranirea.Dupa copulatie la inceputul lunilor aprilie – mai, femelele perforeaza bobocii florali si depun ouale. Ponta dureaza pana in cursul lunilor mai si iunie. Incubatia dureaza 4-14 zile.Larvele isi fac aparitia la deschiderea bobocilor florali si se hranesc cu organele florale.In cursul lunilor iunie –iulie apar adultii din noua generatie, care, dupa o perioada de hranire de cateva saptamani,se retrag pentru hibernare.*
CEUTORHYNCHUS ASSIMILIS (gargarita silicvelor),*adultul are corpul de 2-2,8 mm lungime de culoare neagra.Pronotul prezinta cate un tubercul evident. Elitele sunt alungite si trptat ingustate posterior.Larva are corpul curbat, de 3-5 mm lungime si de culoare alba,iar capsula cefalica bruna. Ierneaza ca insecta adulta in stratul superficial al solului.In primavara,in cursul lunilor aprilie- mai, gargaritele parasesc locul de hibernare migrand in cultura.Depunerea pontelor are loc in siligvele in formare.Pentru depunerea pontelor femela roade un orificiu in peretele siligvei si,in fiecare orificiu ros,depune un ou.O femela depune 35-50 oua. Incubatia dureaza 8 -11 zile.La completa dezvoltare larvele rod orificii in peretii siligvei dupa care parasesc locurile de hrana, si se retrag in stratul superficial, unde se inpupeaza.Noii adulti apar la inceputul lunii august si se hranesc cu plante crucifere spontane sau cultivate pana in toamna cand se retrag pentru hibernare.*
PLUTELLA XYLOSTELLA (molia verzei) este un daunator periculos al culturilor de crucifere acesta poate compromite total cultura de rapita in toamna sau primavara prin defoliere.
Larvele se hranesc si cu mugurii florali, flori si siligvele tinere. Semintele din siligvele deteriorate nu se umplu complet si se pot sparge prematur. Larvele ajunse in siligvele tinere consuma semintele in curs de dezvoltare. Hranirea extensiva cu partile plantelor de reproducere si reduce semnificativ randamentul culturii.
Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele de mai jos:

1 **MOSPILAN 20 SG /GAZELLE - 0,15 kg./ha sau**
2. **MOSPILAN 20 SP / KRIMA 20 SG - 0,150 kg./ha. sau**
3. **KARATE ZEON /NINJA - 0,15 l/ha sau**
4. **MAVRIK 2 F / EVURE - 0,2 l/ha.la inflorire sau**
5. **APIS 200SE/ ACEPTIR 200SE - 0.12- 0.25 l/ha sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate,pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.
Tratamentul se va complexează cu fungicide pentru combaterea bolilor: **PHOMA LINGAM** (putregaiul negru); **SCLEROTINIA SCLEROTIORUM** (sclerotinia); **ERYSIPHE COMMUNIS** (făinarea); **ALTERNARIA BRASSICAE** (alternarioza).

1. SINSTAR/ AZOXIPROL – 0,75-1,0 l/ha sau
2. SCORE 250 EC/MAVITA 250 EC – 0,5 l/ha sau
3. MATIZ / ERASMUS – 1.0 l/ha sau
4. FULIAL / FORTUNA MAX – 0.75- 1.0 l /ha sau
alte produse pentru protectia plantelor omologate,pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.
Perioada optimă de tratament: **In faza fenologică de imbobocire.**
Pragul economic de daunare este de: 2- 3 adulți /plantă in stadiul de boboci florali pentru Meligethes aeneus
. - 2-3 larve/ plantă PLUTELLA XYLOSTELLA.

CERINŢE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI:
Pentru prevenirea intoxicaţiilor la albine, unitaţile agricole, care execută tratamente fitosanitare cu pesticide, pentru combaterea daunătorilor specifici culturii de rapită sunt obligaţi:
Să înștiinţeze în scris cu cel putin 48 de ore înainte de începerea tratamentului, consiliile locale cât şi apicultorii care au vatra de stupină staţionară/permanentă sau temporară /pastoral, aducând la cunostinţă urmatoarele informaţii:
- locul efectuării tratamentului;
- data începeri şi durata tratamentului;
- denumirea produsului folosit şi remanenta acestuia;
- metoda de aplicare/stropire, şi utilajul cu care se execută tratamentul;

Să efectueze tratamente fitosanitare pe timp liniștit, fără vânt;
În perioada înfloririi culturilor a caror polenizare se face prin insecte, tratamentele se efecuează numai cu produse de protecţie a plantelor „selective pentru insectele polenizatoare" albine, bondari.
Alte recomandări:
Verificati,cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!
Se va verifica cu mare atentie, recomandarile inscrise pe eticheta produsului de protectie a plantelor inainte de utilizare!
Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!
Respectati cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitate a muncii, de protecţie a animalelor si familiilor de albine în conformitate cu :Legea Apiculturii nr. 383/2013 , cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 127/1991 al ACA din Romania , Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală si1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor.
Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii urale, nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor .
Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministerului Agriculturiii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/542015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare ,
Maria BOGDAN