AUTORITATEA NAȚIONALĂ

NR: 13241
DATA: 02/06/2026
COD: F2E6
COMUNA MOGOSOAIA

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV- CĂLĂRAȘI – GIURGIU

OFICIUL FITOSANITAR ILFOV,Str.Zorilor nr.21,Ștefanești de Jos, judetul Ilfov,
Tel:021.3379.739, e-mail:ofilfov@anfdof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr.52 din 02.06. 2026

Oficiul Fitosanitar Ilfov recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la culturile de: **TOMATE, ARDEI, VINETE - in camp.**

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **PHYTOPHTHORA INFESTANS (mana tomatelor); SEPTORIA LYCOPERSICI (septorioza): ALTERNARIA SOLANI (alternarioza)**

PHYTOPHTHORA INFESTANS (mana tomatelor) *atacul se manifesta pe frunze,tulpini si fructe.Pe frunze apar pete galbui situate la varful foliolelor. Datorita necrozei tesuturilor, petele foliare devin brune –negricioase si sunt inconjurate de o bordura galbuie. Pe fata inferioara a frunzelor, in dreptul petelor, pe vreme umeda se observa un puf albicios format din sporangiofori. Pe tulpini apar pete brune, izolate sau confluente. Pe fructe apar pete brune violacee, mai mari sau mai mici , care se formeaza in dreptul pedunculului si apoi cuprind intregul fruct.*

SEPTORIA LYCOPERSICI (septorioza), *boala se manifesta pe frunze si tulpini, pe care apar pete (de 2 – 3mm) aproape circulare, de culoare bruna – cenusie, delimitata de o margine mai inchisa. Dupa o perioada petele devin albicioase si prezinta pe suprafata lor numeroase puncte negre. Tesuturile se necrozeaza, iar frunzele afectate se usuca, incepand cu cele bazale. Atacul pe tulpina se manifesta prin aparitia unor pete cenusii,adancite in tesuturi, care au pe suprafata lor pete brune – negricioase.*

ALTERNARIA SOLANI (alternarioza) , *plantele pot fi atacate in toate fazele de dezvoltare. Cea mai frecventa forma de atac produsa de aceasta ciuperca se constata pe frunzele bazale sub forma unor pete izolate,circulare,brune,zonate concentric.Cand numarul petelor se mareste, frunzele se usuca.Pe tulpini, petioluri si pedunculi apar pete ovoide concentrice,brun-negricioase.infectiile pe fructe se manifesta prin pete mici,de forma circulara,adancite,mai fregvent in jurul pedunculului.*

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **nr. 2.**

Folositi unul din produsele de mai jos:

1. **CIDELY TOP – 0,1 % sau**
2. **CASINO ROYALE/ PROPIDIN - 0,15 % sau**
3. **CAPTAN 80 WDG / CAPTADIN - 0,15 % sau**
4. **ORTIVA TOP/ SIMPLA - 0,1% sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate,pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul se poate complexa cu insecticide pentru combaterea daunatorilor:

TUTA ABSOLUTA (molia minera a frunzelor); **MACROSIPHUN E.** (paduchele solanaceelor); **LEPTINOTARSA D.** (gandacul din colorado); **TETRANYCHUS URTICAE** (acarianul rosu comun).

TUTA ABSOLUTA (molia minera a frunzelor). ***Adultul*** *(fluture) are culoarea bruna- cenusie,usor argintata,cu pete mici negre pe aripile anterioare;are lungimea de 5-7 mm,anvergura aripilorde 8-10 mm.*

Larva *are 0,5 mm,de culoare crem si capul negru la eclozare;atinge 7-10 mm la completa dezvoltare,este de culoare galben-verzuie,in ultimul stadiu prezinta o banda neagra pe protoroace.*

Ouale *sunt depuse pe partea aeriana a plantelor,o femela depunand in cursul vietii aproximativ 260 de oua.Eclozarea dureaza 5-7 zile la temperatura de 26-30 C si umiditate relativa de 60-75%, larvele trecand ulterior prin patru stadii larvare, aproximativ 20 de zile.Impuparea are loc in sol,la o adancime de 1-2 cm,in interiorul minelor sau pe frunze.Atata timp cat exista hrana disponibila daunatorul nu intra in diapauza.Dupa 10-13 zile de la impupare apar noii adulti.*

MACROSIPHUN E. (paduchele de frunze),*ataca preferential tomatele si vinetele.Formeaza colonii aglomerate pe partea inferioara a frunzelor si dispersate pe inflorescente. In camp atacul cu o densitate numerica mai mare are loc in lunile mai – iunie si august – septembrie. Daunatorul ataca in stadiul de larva si adult. Afecteaza plantele prin intepare, de unde absorb hrana din tesuturi.*

1. **POLECI /DECA – 2,5 EC -0,03- 0,05 % sau**

2. **JACKPOT 2,5 EC /DELTASAP 2,5 EC-0,05 %. sau**
3. **MAVRIK 2F /EVURE – 0,05 %sau**
4. **DELTAGRI/ FASTER DELTA – 0,04 % sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate,pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei

Perioada optimă de tratament: **LA APARITIA PRIMELOR SIMPTOME.**

ATENTIE!!

Întotdeauna utilizați produse de protecție a plantelor omologate pentru cultura pe care intenționați să aplicați tratamente fitosanitare,cu respectarea instrucțiunilor inscrise pe eticheta produsului și respectarea cu strictețe a timpului de pauză de la ultimul tratament pâna la data recoltarii.

Alte recomandari:

Verificați,cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire,de pe eticheta produsului.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurator!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor,normele de protecție si securitate a muncii,de protecție a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din România,Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentației,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației,in vederea protecției familiilor de albine, impotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor);

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului Apelor si Pădurilor si al președintelui Autoritații Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea in cadrul schemelor si măsurilor de sprijin pentru fermieri in România,cu modificarile ulterioare.

Agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor au următoarele obligaţii:

1. Să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor;
2. Să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare;
3. Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse;
4. Să nu aplice tratamente cu produse de proteceie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii;
5. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţie a plantelor în exploataţiile agricole, aşa cum sunt prevazute la cap. VI pct. 6.3 – 6.7 din Codul de bune practici în ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.234/2006.

Cerinţe obligatorii pentru fermieri: Conform Hotărârii 1230 din 12 Decembrie 2012, art.67, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European, utilizatorii profesionişti de produse de protecţie a plantelor au obligaţia să păstreze pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, evidenţa produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează.

În registrul în care ţin evidenţa produselor de protecţie a plantelor se va specifica:

- denumirea produsului de protecţie a plantelor;
- momentul aplicării;
- doza;
- zona si cultura pentru care s-a folosit produsul de protecţie a plantelor.

La cerere, utilizatorii profesionişti pun la dispoziţia inspectorilor fitosanitari informaţiile relevante din evidenţele respective.

Nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a prevederilor art. 67 alin.(1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 8000 lei la 10000 lei, conform Hotărârii 1230 din 12 decembrie 2012, Art. 3 alin. (1), litera i.